IMPLANT EN DEUX TEMPS

Un implant sur des bases solides

Le protocole de référence : l'implant est posé sur un site cicatrisé, avec un temps de cicatrisation dédié. Quand l'os ou la gencive manque, on renforce d'abord — greffe osseuse, soulevé de sinus ou greffe gingivale — pour une base parfaitement sûre.

3–4 mois
OSTÉO-INTÉGRATION

3D
PLANIFICATION GUIDÉE

3
RENFORTS POSSIBLES



Illustration 3D

LE PRINCIPE

La solution éprouvée, même quand l'os manque

L'implant remplace la racine de la dent et sert d'ancrage à une couronne fixe. Quand le volume osseux ou gingival est insuffisant, on **reconstruit d'abord la base** — de façon planifiée et indolore — pour poser l'implant en toute sécurité.

Protocole de référence

Un implant en titane biocompatible, éprouvé depuis des décennies, avec un taux de succès très élevé.

Une base sur-mesure

Greffe osseuse, soulevé de sinus ou greffe de gencive : on prépare exactement le terrain dont votre implant a besoin.

Planification 3D précise

Chaque étape est simulée sur un scanner 3D : position, profondeur et angle de l'implant décidés à l'avance.

LA CHIRURGIE GUIDÉE

Une pose au guide chirurgical, à la précision millimétrique

À partir de votre scanner 3D, on conçoit un **guide chirurgical sur-mesure** : une fine gouttière qui se pose sur vos dents et dirige l'implant exactement à la position, l'angle et la profondeur planifiés sur ordinateur — dans tous les cas, avec ou sans greffe.

1

Scan 3D + empreinte

On numérise votre mâchoire en 3D (scanner + empreinte optique).

2

Planification virtuelle

La position, l'angle et la profondeur idéaux de l'implant sont décidés sur ordinateur.

3

Pose guidée

Un guide sur-mesure est imprimé : il dirige l'implant exactement comme prévu, en toute sécurité.

Résultat : une chirurgie **plus précise et plus sûre** — le guide protège les nerfs, le sinus et les dents voisines, souvent sans incision, avec moins de gonflement et une récupération plus rapide.



Planification guidée : positionnement virtuel des implants avant l'impression du guide

« FAUT-IL UNE GREFFE ? »

Deux chemins, selon votre volume d'os

On évalue le volume d'os et de gencive en 3D

CAS A · VOLUME SUFFISANT

Pose directe de l'implant

L'os est suffisant : l'implant est posé directement, puis on laisse la cicatrisation se faire (3 à 4 mois) avant la couronne.

CAS B · VOLUME INSUFFISANT

On renforce, puis on pose

On reconstruit d'abord l'os ou la gencive (parfois dans le même temps que la pose). Après cicatrisation, l'implant repose sur une base solide et durable.

Dans les deux cas, tout est planifié à l'avance : vous savez exactement ce qui vous attend, étape par étape.

LES TECHNIQUES DE RENFORT

Reconstruire le terrain, quand c'est nécessaire



Greffe osseuse

Quand l'os n'est pas assez large ou haut, un biomatériau sert d'échafaudage : votre propre os repousse dessus et forme une base solide pour l'implant.



Soulevé de sinus

Pour les molaires du haut, on soulève délicatement la membrane du sinus et on ajoute de l'os en dessous, afin de créer la hauteur nécessaire à l'implant.



Greffe gingivale

On épaissit ou on ajoute de la gencive ferme autour de l'implant : meilleure santé des tissus, esthétique naturelle et résultat durable.

NOTE CONFORT

Greffes et pose se font **sous anesthésie locale, sans douleur**. Les matériaux sont biocompatibles et parfaitement tolérés – et chaque temps de cicatrisation garantit un résultat stable.

EN IMAGES



Guide chirurgical : le plan 3D transféré précisément en bouche



Structure d'un implant : couronne · pilier · implant

VOTRE PARCOURS

Les rendez-vous, étape par étape

1

Consultation + radio 3D (CBCT)

30–45 min

- Bilan et analyse du volume d'os
- Plan de traitement en 3D

2

Greffe / soulevé de sinus (si nécessaire)

45–90 min

- Reconstruction de l'os ou de la gencive
- Cicatrisation de 4 à 6 mois

3

Pose de l'implant

45–60 min

- Mise en place de l'implant en titane
- Ostéo-intégration de 3 à 4 mois

4

Contrôle post-opératoire (2 semaines)

10–15 min

- Vérification de la cicatrisation
- Contrôle des sutures

5

Cicatrisation + empreinte numérique (3–4 mois)

30 min

- Implant parfaitement intégré
- Scan 3D pour la couronne

6

Pose de la couronne définitive

20–30 min

- Essayage et ajustement précis
- Fixation de la dent définitive

7

Contrôle final (si nécessaire)

20 min

- Vérification de l'occlusion
- Derniers réglages de confort