TRAITEMENT GLOBAL DES GENCIVES

Sauver vos dents avant qu'il ne soit trop tard

La parodontite est une infection bactérienne sévère qui détruit la gencive et l'os qui soutiennent vos dents. Non traitée, elle mène à la mobilité puis à la perte des dents – mais elle se soigne, méthodiquement.

2h
ASSAINISSEMENT COMPLET

99,9%
BACTÉRIES ÉLIMINÉES

3 mois
CONTRÔLE DÉCISIF



Avant / après

POURQUOI IL NE FAUT PAS ATTENDRE

Une infection qui dépasse la bouche

Les bactéries passent directement dans la circulation sanguine et multiplient les risques pour tout l'organisme.

Infection parodontale active

Cœur & vaisseaux
Risque accru de maladies cardiovasculaires.

AVC
Risque augmenté d'accident vasculaire cérébral.

Diabète
Complications et déséquilibre du diabète.

COMMENT ON LA DÉTECTE


Les signes qui doivent alerter

Signes cliniques

- Gencives rouges, gonflées et qui saignent facilement.
- Déchaussement : les dents paraissent plus longues.
- Mauvaise haleine persistante et mobilité des dents.

Signes radiologiques

- Perte de hauteur de l'os visible sur la radio.
- Blocs de tartre sous-gingival foncés, cachés sous la gencive.



Récession gingivale & profondeur de poche (schéma). Wikimedia Commons · CC BY-SA

AVANT / APRÈS LE TRAITEMENT

De la gencive infectée à la gencive saine



LE TRAITEMENT · PHASE 1

Désinfection globale, sans chirurgie

Assainissement initial

NON-CHIRURGICAL

Surfaçage « bouche complète »

Toute la bouche est nettoyée en profondeur en une seule séance optimisée de 2h, sous anesthésie locale profonde. On traite tous les espaces sous-gingivaux en même temps pour éviter toute re-contamination croisée.

Débridement au laser


Un laser détruit 99,9% des micro-bactéries profondes résiduelles, bio-stimule les tissus, arrête instantanément le saignement et déclenche la ré-attache de la gencive.

Confort absolu, zéro douleur

La séance de 2h se fait sous anesthésie locale profonde : vous ne sentez rien, et tout est traité en une fois.

L'ÉTAPE DÉCISIVE

Le contrôle des 3 mois : le carrefour du traitement



Contrôle de réévaluation, 3 mois après l'assainissement

C'est exactement le temps biologique nécessaire pour que l'os et la gencive cicatrisent. On refait une carte de sondage des poches pour décider de la suite.

FEU VERT · POCHES DISPARUES

Maintenance préventive

Les tissus sont sains et stables. Vous passez à un simple suivi préventif régulier pour garder ce résultat à vie.

Contrôle tous les 6 mois

FEU ROUGE · POCHES PERSISTANTES

Passage en Phase 2

Si des poches profondes résistent, on cible uniquement ces zones avec un traitement chirurgical précis. Rien d'inutile.

Chirurgie ciblée

LE TRAITEMENT · PHASE 2

Chirurgie ciblée, uniquement si nécessaire

Réservée aux zones qui résistent à la Phase 1. Trois approches, choisies selon le besoin réel.

Lambeau d'accès

On soulève délicatement la gencive pour un nettoyage visuel ultra-profond des racines, là où l'œil ne passait pas.

Chirurgie régénératrice

Des biomatériaux sont posés pour reconstruire l'os perdu et redonner du soutien aux dents.

Greffe de gencive

La chirurgie plastique parodontale recouvre les racines exposées et épaissit la gencive.


EN IMAGES



Surfaçage : élimination du tartre et des bactéries en profondeur



Traitement laser : désinfection et arrêt du saignement



Tartre sous-gingival visible avant traitement

VOTRE PARCOURS

Le déroulé, étape par étape

1

Diagnostic & bilan parodontal

45 min

- Carte de sondage des poches
- Radios pour évaluer l'os

2

Assainissement bouche complète + laser

2h

- Surfaçage de toute la bouche en une séance
- Laser anti-bactérien
- Sous anesthésie – zéro douleur

3

Réévaluation décisive (3 mois)

30 min

- Nouvelle carte de sondage
- Décision : maintenance ou Phase 2

4

Selon le résultat

tous les 6 mois

- Feu vert → maintenance préventive
- Feu rouge → chirurgie ciblée (Phase 2)